

**טבליות רימדיל,  
וטרינרי**  
**Rimadyl tablets  
veterinary**

RIMATAB PL SH 1114 GLUE

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

**טבליות רימדיל, וטרינרי**  
**Rimadyl tablets veterinary**  
**חייב מרשם רופא וטרינר**

**הרכב:** רימדיל 20 מ"ג וטרינרי, הן טבליות בצבע לבן, ומכילות Carprofen (vet) 20mg  
רימדיל 50 מ"ג וטרינרי, הן טבליות בצבע לבן, ומכילות Carprofen (vet) 50mg  
רימדיל 100 מ"ג וטרינרי, הן טבליות בצבע לבן, ומכילות Carprofen (vet) 100mg

**קבוצה תרפויטית:**

נוגדי דלקות שאינם סטרואידים (NSAIDS)

הטבליות משמשות להקלת דלקות וכאבים כרוניים של השרירים ושל העצמות.

**פעילות רפואית:**

רימדיל משמש כמשכך כאבים ותכשיר אנטי-דלקתי אצל כלבים.

**מינון:** מומלץ לתת מינון התחלתי של 2 עד 4 מ"ג/ק"ג ליום בשתי מנות מחולקות. אפשר לתת מנה יומית אחת מוקטנת של 2 מ"ג/ק"ג לאחר 7 ימים בהתאם לתגובה קלינית. זמן הטיפול הינו תלוי בתגובה קלינית של הכלב אך יש לערוך בדיקה אצל הרופא וטרינר לאחר 14 יום טיפול.

**התוויות נגד:**

אין לתת לחיות הסובלות מ:  
מחלת כליה או כבד  
כיבים במערכת העיכול  
דימומים  
רגישות לתרופה

אין לתת בו זמנית או בתוך 24 שעות תכשיר אחר מקבוצה זאת של תרופות נגד כאבים ודלקות.

**אזהרות:** אין לעבור על המנה או על זמן הטיפול המומלצים. כמו עם תכשירים נגד דלקות לא-סטרואידים אחרים, עלולות להופיע הפרעות במערכת העיכול. תופעה זו בכלב נדירה ותלויה במתן מינון מעל המינון המומלץ. התרופה אינה מומלצת לשימוש בכלבות הרות ומיניקות. יש להיזהר במתן לחיות בגיל 6 שבועות ומטה – יתכן וכדאי להוריד את המינון. אין לתת לחיות שהתייבשו או עם תת לחץ דם.

### **תופעות לוואי:**

נראו מקרים של בעיות בכבד ושינויים בתפקוד אנזימי כבד, שלשולים, הקאות, דלקת בעור (דרמטיטיס), בעיות בעיניים, חוסר תיאבון, עייפות, שינויים התנהגותיים.

**אחסנה:** בטמפ' החדר מתחת ל  $25^{\circ}\text{C}$  במקום יבש מוגן מאור.  
לאחר פתיחת אריזת בקבוק, יש להשתמש בתכולה בתוך 3 חודשים.

הרחק מהישג ידם של ילדים.

מספר רישום התרופה:

רימדיל 100 מ"ג: 082.90.92330

רימדיל 20 מ"ג: 083.34.92226

רימדיל 50 מ"ג: 083.31.92227

היצרן: פייזר אנימל הלת', בלגיה  
בעל הרישום: פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9 הרצליה פיתוח