

מספר וחוזק טבליות				משקל גוף (ק"ג)
95 מ"ג	75 מ"ג	30 מ"ג	6 מ"ג	
			2 טבליות	5-6
		1 טבליה		7-10
		1 טבליה		11-15
			2 טבליות	16-20
		1 טבליה	1 טבליה	21-23
		2 טבליות		24-30
	1 טבליה			31-37
1 טבליה				38-47
	1 טבליה	1 טבליה		48-52
1 טבליה		1 טבליה		53-62
	2 טבליות			63-75

עצות לשימוש נכון:

יש לתת טרוקוקסיל וטרינרי מיד לפני או במשך הארוחה העיקרית של הכלב. יש לשים לב שהטבליה נבלעה.

אזהרה: התרופה מיועדת לטיפול בכלבים בני 12 חודשים ויותר.

תופעות לוואי:

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות: שלשול, הקאה. תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות: אובדן תיאבון, שלשול דמי, צואה שחורה, אדישות, שינוי בתוצאות ביוכימיות של פרמטרים כליתיים ופגיעה בתפקוד הכליות. במקרים נדירים תופעות אלו עלולות לגרום למוות. תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות: כיב קיבה. אם תופעות אלו מופיעות, יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לוטרינר. במקרים של תופעות לוואי הקשורות למערכת העיכול או הכליה, ייתכן ויהיה צורך במתן טיפול תומך (כדורים שמגנים על הקיבה או מתן נזולים תוך ורידי).

פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו לשימוש וטרינרי בלבד

טרוקוקסיל וטרינרי 6 מ"ג
טרוקוקסיל וטרינרי 20 מ"ג
טרוקוקסיל וטרינרי 30 מ"ג
טרוקוקסיל וטרינרי 75 מ"ג
טרוקוקסיל וטרינרי 95 מ"ג
Chewable tablets for dogs

הרכב:

כל טבליה של טרוקוקסיל וטרינרי 6 מ"ג מכילה Mavacoxib 6 mg
 כל טבליה של טרוקוקסיל וטרינרי 20 מ"ג מכילה Mavacoxib 20 mg
 כל טבליה של טרוקוקסיל וטרינרי 30 מ"ג מכילה Mavacoxib 30 mg
 כל טבליה של טרוקוקסיל וטרינרי 75 מ"ג מכילה Mavacoxib 75 mg
 כל טבליה של טרוקוקסיל וטרינרי 95 מ"ג מכילה Mavacoxib 95 mg

קבוצה תרפואית:

טרוקוקסיל וטרינרי שייך לקבוצת תרופות נוגדי דלקות לא סטרואידליות (NSAIDs) המשמשות לטיפול בכאבים ודלקות.

התוויה:

לטיפול בכאב ודלקת הקשורים למחלת פרקים ניוונית בכלבים כאשר יש צורך בטיפול של יותר מחודש אחד.

מתן: למתן דרך הפה.

מינון:

יש לתת את המנה כפי שנקבעה על ידי הוטרינר. המנה של טרוקוקסיל וטרינרי טבליות ללעיסה היא 2 מ"ג/ק"ג משקל גוף (ראו טבלה).
זהו אינו טיפול יומי. יש לחזור על הטיפול ההתחלתי לאחר 14 יום, ולאחר מכן הטיפול יינתן **אחת לחודש**. במחזור טיפול בטרקוקסיל וטרינרי אין לעבור על כמות של 7 מנות עוקבות (6.5 חודשים).

לטרקוקסיל וטרינרי יש השפעה ארוכת טווח (עד 2 חודשים לאחר מתן המנה השניה והמנות שאחריה). תופעות לוואי יכולות להופיע בכל נקודת זמן במהלך תקופה זו. אם הכלב סובל מתופעת לוואי כלשהי, כולל תופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הוטרנר.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

התוויות נגד - אזהרות:

אין להשתמש בכלבים בני פחות מ-12 חודשים ו/או השוקלים פחות מ-5 ק"ג.
אין להשתמש בכלבים הסובלים מבעיות במערכת העיכול כולל כיב ודימום.
אין להשתמש אם יש ראיות לדימום.
אין להשתמש אם יש ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד.
אין להשתמש במקרים של אי ספיקת לב.
אין להשתמש בחיות הרות, מרביעות או מניקות.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לחומר הפעיל.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לסולפונאמידים.
אין להשתמש במקביל לגלוקוקורטיקואידים או NSAIDs אחרים.

עצות לבעל הכלב:

לפני שהוטרנר ירשם לכלב טרוקוקסיל וטרינרי ובמשך הטיפול בטרקוקסיל וטרינרי, הוטרנר יבדוק אם יש לכלב בעיות בתפקוד הכליות והכבד וכן אם קיימת מחלת מעיים.

אין להשתמש בטרקוקסיל וטרינרי בכלבים הסובלים מהתייבשות.
אם כלבך זקוק לניתוח, עליך ליידע את הוטרנר המנתח כי הכלב מטופל בטרקוקסיל וטרינרי. אין לטפל בו זמנית או לפחות במשך חודש אחד אחרי המתן האחרון של טרוקוקסיל וטרינרי, גם בתרופות אחרות ממשפחת NSAIDs או בגלוקוקורטיקואידים.
לטרקוקסיל וטרינרי השפעה ארוכת טווח (עד 2 חודשים לאחר מתן המנה השניה וכל מנה אחריה). תופעות לוואי עלולות להופיע בכל נקודת זמן במהלך תקופה זו. אם מופיעה תופעת לוואי במהלך הטיפול בטרקוקסיל וטרינרי, יש להפסיק את הטיפול ולהתייעץ מיד עם הוטרנר.

אין להשתמש בחיות הרות, מרביעות או מניקות.
יש לדווח לטרינר אם הכלב מטופל בתרופות מדללות דם.
אין לחרוג מהמנה שנרשמה על ידי הוטרנר. אם בטעות בלע אדם את התרופה, יש להתייעץ מיד עם רופא ולהראות לו את אריזת התרופה והעלון.
אם יש לך רגישות ידועה ל NSAIDs עליך להימנע ממגע עם התרופה.
בליעת טרוקוקסיל וטרינרי עלולה להזיק לילדים, וההשפעה הממושכת שלו יכולה להוביל למשל להפרעות במערכת העיכול.

על מנת להימנע מבלעיה בטעות יש לתת את הטבליה לכלב מיד עם הוצאתה מהאריזה.

אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך המגע עם התרופה.
יש לשטוף ידיים לאחר מגע עם התרופה.

שימוש בזמן ההריון וההנקה:

אין להשתמש בחיות הרות, מרביעות או מניקות.

חומרים בלתי פעילים:

Compressible sugar
Silicified microcrystalline cellulose
Artificial powdered beef flavour
Croscarmellose sodium
Sodium laurilsulfate
Magnesium stearate

תנאי אחסון:

יש לאחסן בטמפרטורת החדר, מתחת ל-30°C.

יש לשמור באריזה המקורית.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה הרשום על גבי האריזה.

שימוש וטרינרי:

חייב במרשם רופא וטרינר. לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

אריזה:

האריזה מכילה מגש ובו 2 טבליות מאותו חוזה.

טרוקוקסיל וטרינרי 6 מ"ג: 150 16 33566 00

טרוקוקסיל וטרינרי 20 מ"ג: 150 15 33567 00

טרוקוקסיל וטרינרי 30 מ"ג: 150 14 33568 00

טרוקוקסיל וטרינרי 75 מ"ג: 150 13 33569 00

טרוקוקסיל וטרינרי 95 מ"ג: 150 12 33570 00

יצרן: Pfizer Italia S.r.l Italy, Localita Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italy

בעל הרישום: זואטיס ישראל הולדינג בי.וי.,
רח' עתיר ידע 5, כפר סבא.

zoetis

TROC C-TAB VET SH 020216