

## POULVAC® E. COLI

### תרכיב נגד *E. coli* בעופות

מכיל תרביות חיות

לשימוש וטרינרי בלבד.

לשימוש בעופות בלבד.

#### הרכב התרכיב למנה:

Live *aroA* gene deleted *Escherichia coli*, type O78, strain EC34195 -  $5.2 \times 10^6$  -  $9.1 \times 10^8$  CFU\*

\* Colony forming units when grown on tryptic soy agar plates.

**התוויה:** תרכיב Poulvac® E.coli הינו תרכיב חי מוחלש, המיועד לחיסון המוני של תרנגולות (פטמים), פרגיות להטלה ועופות רבייה) או תרנגולי הודו בריאים, באמצעות ריסוס או במי השתייה, לסיוע במניעת מחלה הנגרמת על ידי החיידק *Escherichia coli*.

**התוויות נגד:** אין לחסן בעלי חיים המקבלים טיפול אנטי-חיידקי או מדכא מערכת חיסון. **תופעות לוואי:** לא ידועות. במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל.

#### הוראות שימוש:

**הוראות הכנת התרכיב:** הסר את החתם ואת הפקק מאמפולת התרכיב. מלא את האמפולה עד חציה במים מזוקקים קרים. החזר את הפקק למקומו ונער היטב את האמפולה, עד להמסת התרכיב. מזוג את התרכיב המומס אל תוך מיכל נקי, והוסף מים מזוקקים קרים על מנת לדלל את התרכיב, בהתאם לצידוד הקיים במשק לחיסון עופות באמצעות ריסוס, או למערכת המים של המשק. יש לחסן כך שכל עוף יקבל מנת תרכיב אחת, בהתאם להוראות השימוש בצידוד החיסון הקיים במשק (על ידי ריסוס או מי שתייה). נפח התרכיב המומלץ למנה אחת הינו 0.1-0.5 מ"ל. מרחק הריסוס צריך להיות בין 30 ל-80 סנטימטרים מעל לבעל החיים, על מנת לאפשר פיזור אחיד של התרכיב וגודל טיפות רצוי (מעל 100 מיקרון).

מומלץ לחסן את כל העופות הרגישים (שלא חוסנו בעבר) במשק באותו זמן. **תרנגולות:** יש לחסן באמצעות ריסוס או דרך מי השתייה, בגיל יום או יותר. במטילות ועופות רבייה, מומלץ לחזור על החיסון בגיל 12-14 שבועות.

**תרנגולי הודו:** יש לחסן באמצעות ריסוס בגיל 3 ימים ולחזור על החיסון בגיל 3 שבועות.

#### זמן המתנה: 21 ימים

**אחסנה:** יש לאחסן את אמפולת התרכיב במקום חשוך, בטמפ' של 2-7°C. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות ו/או לקרינת שמש ישירה עלולה לפגוע ביעילות התרכיב.

#### אזהרות:

יש להשתמש תוך שעתיים לאחר ההמסה.

אין להקפיא את התרכיב.

השתמש בכל תוכן התרכיב מייד לאחר הפתיחה.

יש לוודא שמיכל הריסוס אינו מכיל שאריות של חומרי חיטוי כימיים או כל חומר אחר אשר עלול לפגוע ביעילות התרכיב.

אין לחסן עופות במשך 21 ימים לפני השחיטה.

אין לטפל בעופות באנטיביוטיקה במשך 7 ימים לפני ואחרי החיסון, שכן טיפול אנטיביוטי עלול לפגוע ביעילות התרכיב.

במהלך 10-14 ימים שלאחר החיסון, יש לנקוט אמצעי זהירות על מנת למנוע נשיאת שאריות תרכיב על הבגדים או הנעליים והעברתן לאזורים בהם חיים עופות לא מחוסנים.

### **אזהרות לאדם:**

#### **לשימוש וטרינרי בלבד.**

הרחק מהישג ידם של ילדים.

המנע מבליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.

אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.

APPROVED



05.02.20

יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.

במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש לפנות מיידית לייעוץ רפואי ולהציג את תווית התרכיב.

**השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הווטרינר המטפל בלבד.**

**יצרן:** Zoetis Inc., 333 Portage Street, Kalamazoo, MI 49007, USA

**בעל הרישום:** Zoetis Israel Holding B.V, עתיר ידע 5, כפר סבא

**מספר רישום:** 1-251-16-16