

ScourGuard 4 KC

Bovine Rotavirus-Coronavirus Vaccine, Clostridium Perfringens Type C, Escherichia Coli Bacterin Toxoid

ScourGuard 4 KC הינו תרכיב נוזלי, המכיל נגיפים מומתים של (Bovine Rotavirus (serotypes G6, G10), ושל Bovine Coronavirus שגודלו בתרביות תאים, ובקטרינים של *E. Coli* K99 וטוקסואידים של *Clostridium Perfringens* Type C. התרכיב מכיל אדג'ובנט להגברת התגובה החיסונית.

מרכיבי התרכיב במנה אחת (2מ"ל):

Bovine Rotavirus Strain Lincoln Isolate	$\geq 1.31 \text{ RP}^1$
Bovine Rotavirus Strain B223	$\geq 1.00 \text{ RP}^1$
Bovine Coronavirus Strain Hansen Isolate	$\geq 1.20 \text{ RP}^1$
<i>Escherichia Coli</i> (K99 pilus antigen) Strain NL-1005	$\geq 1.00 \text{ RP}^1$
<i>Clostridium perfringens</i> Type C Strain NL-1003, producing beta toxin	$\geq 10 \text{ IAU}^2/\text{ml}$

¹RP - Relative Potency

²IAU – International Antitoxin Units

אדג'ובנט: Quil A

חומר משמר: Gentamicin, Merthiolat

התוויות: התרכיב מיועד לחיסון של פרות ומבכירות הרות לסיוע במניעה של שלשול בעגליהן, הנובע מנגיף רוטה של בקר (Bovine Rotavirus (serotypes G6, G10), נגיף קורונה של בקר (Bovine Coronavirus), זנים אנטרו-טוקסיגניים של *E. Coli* בעלי גורם הצמדות K99 ו-*Clostridium perfringens* מטיפוס C.

תופעות לוואי והתוויות נגד: לא נצפו תופעות לוואי משמעותיות לאחר מתן התרכיב. בעקבות החיסון עלולה להופיע עלייה זמנית בטמפרטורת הגוף. במקרה של תגובה אנפילקטית, מומלץ לתת אפינפרין כאנטידוט ראשוני וטיפול תומך בהמשך ככל שיידרש. במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל טלפון 09-7886640.

מין מטרה: בקר.

מינון, אופן ודרך מתן והוראות שימוש: מומלץ לחסן פרות ומבכירות בריאות בלבד. יש לנער היטב את התרכיב לפני השימוש ולהזריק באופן א-ספטי 2 מ"ל של התרכיב, תוך-שרירית בלבד, באזור הצוואר.

חיסון ראשוני: יש לחסן פרות הרות באמצעות 2 מנות של ScourGuard 4 KC (2 מ"ל כל מנה), במרווח של 3 שבועות בין מנה למנה. המנה השנייה צריכה להינתן 3-6 שבועות לפני מועד ההמלטה.

חיסון חוזר: מומלץ לחזור על החיסון באמצעות מנה אחת (2 מ"ל) של התרכיב 3-6 שבועות לפני כל המלטה.

יש להקפיד על תנאי ממשק נאותים ולנקוט צעדים לשמירה על בריאותם הכללית של בעלי החיים במשק.

זמן המתנה: בשר – 21 ימים.

הוראות אחסון: יש לשמור את התרכיב בטמפרטורה של 2-7°C. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר עלולה לפגוע ביעילות התרכיב. אין להקפיא את התרכיב. אין להשתמש בתרכיב אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. שמור הרחק מהישג ידם ושדה ראיתם של ילדים.

אזהרות הנוגעות לשימוש בתרכיב לחיסון חיית מטרה:

- יש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון לאחר פתיחתו.
- יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים בלבד.
- מכיל ג'נטמיצין ומרטיולאט כחומרים משמרים.
- בעקבות החיסון עלולה להופיע עלייה זמנית בטמפרטורת הגוף.
- התרכיב נמצא יעיל בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית עלולה לא להתעורר בבעלי חיים הנשאים מחלה זיהומית, הסובלים מתת-תזונה או מזיהומים שונים, הנמצאים במצב לחץ כתוצאה מהובלה או תנאי הסביבה או מדוכאי חיסון מסיבות אחרות, או אם החיסון לא ניתן בהתאם להוראות.

אזהרות לאדם המחסן:

- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
- במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לשטוף היטב את מקום ההזרקה ולפנות לקבלת עזרה רפואית ולהציג את תוויית התרכיב.

לשימוש וטרינרי בבקר בלבד.

שימוש בזמן היריון: ניתן לחסן פרות הרות.

אי התאמה ותגובות בין תרופתיות: לא ידועות.

סוג ותכולת האריזה: אריזת קרטון עם 10 בקבוקונים, 10 מנות תרכיב (20 מ"ל) בכל בקבוקון.

טיפול בפסולת וטרינרית: מוצר וטרינרי רפואי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן: Zoetis Inc, Lincoln, Nebraska 68521, USA

בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V., עתיר ידע 5, כפר סבא.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים
בתאריך: 06.2020

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
הינו: 2-141-16-06