

ספירובאק L5**לשימוש וטרינרי בבקר בלבד.**

לפני השימוש, יש לעיין בעלון זה להנחיות מתן מלאות ואזהרות.

תאור המוצר: ספירובאק L5 מכיל זן ייחודי, מומת של *Leptospira Borgpetersenii* Serovar *Hardjo* Bovis יחד עם זנים מומתים של התרביות *L. icterohaemorrhagiae*-*L. pomona*, *L. grippotyphosa*, *L. canicola*.

מרכיבי התרכיב במנה אחת (2מ"ל):

<i>Leptospira canicola</i> – Strain C-51	≥1200 NU*
<i>Leptospira grippotyphosa</i> – Strain MAL 1540	≥1200 NU*
<i>Leptospira borgpetersenii</i> serovar <i>hardjo</i> – Strain 181	≥ 1 x 10 ⁹ organisms
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> – Strain NADL (11403)	≥1200 NU*
<i>Leptospira pomona</i> – Strain T262	≥1200 NU*

*NU – Nephelometric units, pre-inactivation

חומרים לא פעילים: Aluminum Hydroxide (Adjuvant), Merthiolate, Sodium Bisulfite Solution, Sterile Water

התוויות: ספירובאק L5 מיועד לחיסון בקר בריא, כולל פרות בהריון ועגלות מגיל 4 שבועות ומעלה במטרה למנוע מחלה הנגרמת על ידי האורגניזמים הבאים: *Leptospira canicola*, *L.grippotyphosa*, *L.hardjo*, *L.icterohaemoragiae*, *L.pomona*. בנוסף חיסון בתרכיב מומלץ במיוחד למניעה של התבססות של *L. hardjo* בכליה והפרשתו בשתן במשך 12 חודשים לפחות. כמו כן, ספירובאק L5 מונע התבססות של *L. hardjo* בדרכי המין ומסייע במניעת העברת זיהום לעובר.

הוראות שימוש: מומלץ לחסן בקר בריא בלבד. יש לנער היטב את התרכיב ולהזריק באופן אספטי 2 מ"ל תת-עורית או תוך-שרירי באיזור הצדדי העליון של הצוואר.

חיסון ראשוני: בקר בריא צריך לקבל 2 מנות חיסון בהפרש זמן של 4-6 שבועות. כאשר החיסון ניתן במטרה למנוע זיהומים באיברי המין או העובר, יש לתת את המנה השניה שבועיים לפחות לפני מועד ההזרעה. החיסון של עגלים בגיל 4 שבועות ומתן מנה שניה 4-6 שבועות לאחר מכן, ימנע זיהום, התרבות והפרשה של החיידק *Leptospira borgpetersenii* serovar *hardjo* הגורם לזיהום של העדר כולו.

מומלץ לחזור על החיסון באמצעות מנה אחת של התרכיב, מדויי שנה. יש לחסן את כל העדר.

יש להקפיד על תנאי משק נאותים ולנקוט צעדים לשמירה על בריאותם הכללית של בעלי החיים במשק.

אזהרות הנוגעות לשימוש בתרכיב לחיסון חית מטרה:

- יש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון אחרי פתיחתו.
- יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים בלבד.
- זמן המתנה לבשר – 21 ימים.
- במקרה של תגובה אנפילקטית, מומלץ לתת אפינפרין כאנטידוט ראשוני וטיפול תומך בהמשך ככל שיידרש.

- התרכיב נמצא יעיל בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית עלולה לא להתעורר בבעלי חיים הנשאים מחלה זיהומים, הסובלים מתת-תזונה או מזיהומים שונים, הנמצאים במצב לחץ כתוצאה מהובלה או תנאי הסביבה או מדוכאי חיסון מסיבות אחרות, או אם החיסון לא ניתן בהתאם להוראות.
- במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל (טל' 09-7886640)

אזהרות לאדם המחסן:

המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לשטוף היטב את מקום ההזרקה ולפנות לקבלת עזרה רפואית ולהציג את תווית התרכיב.

הוראות אחסון:

יש לשמור את התרכיב במקום חשוך בטמפרטורה של $2-7^{\circ}\text{C}$. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר עלולה לפגוע ביעילות התרכיב. אין להקפיא את התרכיב. אין להשתמש בתרכיב אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. שמור הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של הילדים.

טיפול בפסולת וטרינרית:

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הווטרינר המטפל.



יצרן: Zoetis Inc. 333 Portage Street, Kalamazoo, MI 49007

בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V, עתיר ידע 5, כפוז סבא

13.01.19

משווק: החקלאית, רח' הברקת 20, פארק התעשייה קיסריה 3088900.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 01.2019

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים: 2-282-16-16