

Ultrachoice 8

Clostridium Chauvoei-Septicum-Haemolyticum-Novyi-Sordellii-Perfringens Types C&D Bacterin-Toxoid

תרכיב מומת

בקבוק של 100 מ"ל – 50 מנות לבקר/100 מנות לכבשים

תרכיב לשימוש בבקר ובכבשים בלבד

לשימוש וטרינרי בלבד

תאור המוצר:

תרכיב לשימוש בכבשים ובבקר בריא, למניעה של שחור השוק (blackleg) הנגרם ע"י *C. chauvoei*, malignant edema, הנגרמת ע"י *C. septicum*, bacillary hemoglobinuria, הנגרמת ע"י *C. haemolyticum*, black disease, הנגרמת ע"י *C. novyi*, gas-gangrene, הנגרמת ע"י *C. sordellii* וסימום מעיים (enterotoxemia) ודלקת מעי (enteritis) הנגרמים ע"י *C. perfringens* מטיפוס B, C ו-D.

התרכיב מכיל אנטיגנים מומתים של *C. chauvoei*, *C. septicum*, *C. haemolyticum*, *C. novyi*, *C. sordellii* ו-*C. perfringens* מטיפוס B, C ו-D (המקנים הגנה צולבת גם כנגד טיפוס B), בתוספת אג'וואנט מסיס במים (Stimugen™) להגברת התגובה החיסונית.

הוראות שימוש:

הוראות שימוש כלליות:

- יש לנער היטב את הבקבוק לפני השימוש.
- יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים להזרקה התרכיב.
- יש להשתמש בכל תוכן הבקבוק מייד לאחר הפתיחה.

הוראות שימוש בבקר:

- יש לחסן בקר בריא בלבד.
- יש להזריק באופן סטרילי 2 מ"ל של התרכיב תת עורית, ולחזור על החיסון לאחר 4-6 שבועות.
- על מנת לקבל הגנה טובה מפני *C. haemolyticum*, יש לחזור על החיסון מדי 6 חודשים, בחיות שנמצאות בסיכון גבוה של חשיפה לחיידק.
- יש לחזור על החיסון מדי שנה.

הוראות שימוש בכבשים:

- מומלץ לחסן כבשים בריאות בלבד.
- יש להזריק באופן סטרילי 1 מ"ל של התרכיב תת עורית, ולחזור על החיסון לאחר 4-6 שבועות.
- על מנת לקבל הגנה טובה מפני *C. haemolyticum*, יש לחזור על החיסון מדי 6 חודשים, בחיות שנמצאות בסיכון גבוה של חשיפה לחיידק.
- יש לחזור על החיסון מדי שנה.

תופעות לוואי: לאחר החיסון עלולה להופיע נפיחות זמנית במקום ההזרקה. כמו כן, על פי מחקרים קליניים ודיווחים מהשטח, ירידה זמנית בייצור חלב עלולה להופיע לאחר חיסון של פרות נחלבות. תגובה אנפילקטית עלולה להתרחש אחרי מתן החיסון. מומלץ לטפל במתן אנטידוט (אפינפריין) וטיפול תומך. במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל (טל' 09-7886640).

הוראות אחסון:

יש לאחסן את התרכיב בטמפרטורה של 2-7°C. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר עלולה לפגוע ביעילות התרכיב. אין להקפיא את התרכיב.

זמן המתנה לשיווק: 21 ימים.

אזהרות:

1. לשימוש וטרינרי בלבד.
2. יש להיוועץ בוטרינר המטפל לפני השימוש.
3. מכיל פורמלין כחומר שימור.
4. הרחק מהישג ידם של ילדים.
5. המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
6. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
7. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
8. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.



יצרן: Zoetis Inc, East Lincoln Road, White Hall, Illinois 62092, USA

בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V. עתיר ידע 5 כפר סבא

מספר רישום: 9-250-16-16