

## Ultravac BEF Vaccine

תרכיב למניעת קדחת שלושת הימים (Bovine Ephemeral Fever) בבקר

אריזה של 10 בקבוקונים, 10 מנות תרכיב בכל בקבוקון

לשימוש וטרינרי בלבד

לשימוש בבקר בלבד

**הרכב:** כל מנה של 2 מ"ל תרכיב מכילה נגיפים חיים מוחלשים של Bovine Ephemeral Fever virus, בכמות של  $10^{4.3}$  TCID<sub>50</sub> לפחות. זן הנגיף שבתרכיב (BB2271-919) הוחלש באמצעות העברות עוקבות בתרביות תאים. התרכיב מגיע בבקבוקון בצורת תרחיף מיובש בהקפאה.

יש למהול את התרכיב בחומר מדלל Ultravac BEF Diluent.

**התוויה:** Ultravac BEF הינו תרכיב חי מוחלש, המשמש לסייע במניעה של קדחת קיקיונית / קדחת שלושת הימים (Bovine Ephemeral Fever) הנגרמת על ידי Bovine Ephemeral Fever virus, בבקר מגיל 6 חודשים ומעלה.

**תופעות לוואי:** בעקבות החיסון בתרכיב Ultravac BEF, ניתן להבחין בעליית חום חולפת בבעלי חיים. תגובה זו עלולה לגרום לירידה פתאומית ביצור החלב. במקרה של תופעות לוואי שכלל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל (טל' 09-7886640)

**יעילות התרכיב:** יעילותו של התרכיב נבדקה והודגמה, באמצעות ניסויי חיסון והוקעה (challenge), בבקר בריא.

### הוראות שימוש כלליות:

- לשימוש בבקר בלבד.
- לשימוש בבקר מגיל 6 חודשים ומעלה.
- יש להשתמש במחטים ומזרקים סטריליים להכנת והזרקת התרכיב.

### הוראות הכנה ושימוש בבקר:

- שאב 2 מ"ל של החומר המדלל (Ultravac BEF Diluent), באמצעות מזרק ומחט סטריליים, והעבר אותו לבקבוקון התרכיב.
- שאב את התרחיף שנוצר אל תוך מזרק, והעבר אותו לבקבוקון החומר המדלל (Ultravac BEF Diluent) נער בעדינות את הבקבוק של המדלל, על מנת לפזר בתוכו את התרכיב באופן אחיד (ניעור מוגזם עלול לגרום להקצפה).
- לאחר הערבוב, התרכיב המוכן צריך להיות בעל צבע כתום, ויש להשתמש בו מהר ככל האפשר.
- **חיסון ראשוני:** יש לחסן מגיל 6 חודשים ומעלה. יש להזריק מנה אחת (2 מ"ל) של התרכיב Ultravac BEF Vaccine תת עורית, ולהזריק מנה נוספת (2 מ"ל) של התרכיב בכל עת במרווח זמן בין שבועיים עד 6 חודשים מהחיסון הראשון. נדרשות 2 מנות תרכיב על מנת ליצור חסינות לתווך ארוך.
- **חיסון חוזר:** יש לחזור על החיסון באמצעות מנת דחף אחת (2 מ"ל) של התרכיב Ultravac BEF מדי שנה.

**הוראות אחסון:** יש לאחסן את בקבוקון התרכיב וכן את בקבוק החומר המדלל (Ultravac BEF Diluent)

במקום חשוך, בטמפרטורה של 2-8°C.

**זמני המתנה לאחר חיסון:** זמן המתנה לבשר ולחלב: 0 ימים.


### אזהרות:

- אין להקפיא את התרכיב.

- השתמש בכל תוכן התרכיב מייד לאחר הכנתו.
- יש להשתמש במחטים ומזרקים סטריליים בלבד להכנת והזרקת התרכיב.
- יש להקפיד שהמזרקים והמחטים יהיו נקיים משאריות של חומרי חיטוי, אשר עלולים לפגוע ביעילות התרכיב.
- יש להזריק את התרכיב תת עורית בלבד.
- מוצר זה נבדק ונמצא כיעיל ובטוח בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה לחיסון עלולה שלא להתקיים בבעלי חיים החולים במחלה זיהומית כלשהי, בבעלי חיים הסובלים מתת תזונה, בבעלי חיים הנושאים טפילים, בבעלי חיים הסובלים מעקה או מכשל חיסוני כלשהו, או במקרה שהתרכיב אינו ניתן על פי ההוראות המצוינות בעלון זה.
- השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הווטרינר המטפל בלבד.

#### אזהרות לאדם:

- **לשימוש וטרינרי בלבד.**
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
- במקרה של הזרקה עצמית או חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש לפנות מיידית לייעוץ רפואי ולהציג את תווית התרכיב.



יצרן: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgium

בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V. עת"ר ידע 5 כפר סבא

מספר רישום: 2-281-16-16